A bírálóbizottság értékelése

A bírálóbizottság új tudományos eredménynek Gulácsi László munkájából a következőket fogadta el:

1. Európában elsőként határozta meg a systemas sclerosis (SSc) és annak két formája; a lokalizált és a diffúz kután SSc direk és indirekt költségeit és a két alcsoport költségei közötti szignifikáns különbségeket. Megállapította, hogy a betegségaktivitás szignifikánsan meghatározza mind a közvetlen, mind a közvetett költségeket. A legmagasabb költség a diffúz kután SSc betegek utazási költsége volt.
2. A jelölt és munkatársai elsőként közölték, hogy arthritis psoriatica-ban (AP) a funkcionális állapot, a betegség aktivitása, az orvos és beteg Vizuális Analóg Skálával (VAS) mért véleménye a beteg állapotával, a generikus és betegségspecifikus kérdőívekkel mért életminőséggel szorosan összefügg.
3. Európában másodikként végezte el az AP betegség terhének vizsgálatát és azt állapította meg, hogy a betegség sokízületi formájában legmagasabb a betegségköltség, valamint, hogy hazánkban e betegek életminősége jelentősen rosszabb, mint az általános népességé.
4. Elsőként becsülte meg a biológiai kezelések költséghasznosságát rheumatoid arthritis, arthritis psoriatica, spondylosis ankylopoetica mellett, Crohn betegségben és fekélyes vastagbélgyulladásban a közép-kelet európai országokban és megállapította, hogy a biológiai kezelések költsége nagyrészt a 3 GDP/fő/QALY küszöb alatt marad.
5. A jelölt és munkatársai kimutatták, hogy a rendelkezésre álló kisszámú, 12-24 hétig tartó randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat (RCT) alapján nincs különbség AP-ben a különböző tumor necrosis factor (TNF) hatásossága és biztonsága között.
6. Indirekt metaanalízissel kimutatták, hogy RA-ban a TNF gátlók és a rituximab hatásossága ACR 20 végpontban, a kezelés 24. hetében nem különbözik, és nem különbözik a mellékhatások száma és súlyossága sem.
7. Metaanalízisek alapján megállapították, hogy RA-ban és SpA-ban a TNF gátló és az inflixmab biohasonló kezelés hatásossága és biztonságossága a kezelés 12. és 24. hetében vizsgálva nem különbözik.