

A bírálóbizottság értékelése

A bírálóbizottság a doktori értekezés legfontosabb eredményeit a következőképp összegezi:

- (1) Nagy populáción végzett vizsgálataiban megállapította, hogy a veleszületett trombólizishajlam leggyakoribb formája Magyarországon a Leiden-mutáció okozta APC-rezisztencia és a hordozók között gyakoribb a vetélés, illetve a meddőség előfordulása.
- (2) Eredményei szerint, FVL-hordozókban a perikonceptcionálisan elkezdett LMWH-prophylaxis csökkenti a vetélés előfordulását.
- (3) A jelölt elsőként igazolta, hogy a magasabb vér fibrinogén-szintű várandósok között gyakrabban alakul ki preeclampsia.
- (4) A jelölt bizonyította, hogy a high-grade szerózus papilláris petefészekrák prognosztikájában jelentős szereppel bír a tumorszövet PARP-expressziója, valamint a PAX1, PTEN és CDH1 gének metilációs szintje.
- (5) A korai méhnyakrák radikális műtete során, kedvezőtlen kórjórslati tényezők hiányában a fertilitás megőrizhető.
- (6) Az uterus-mozgató alkalmazásának elhagyása és a colpotomia során fellépő tumorterjedés kockázatának csökkentésére alkalmazott boltozat-bevarrása a nyílt műtétes esetekéhez hasonló gyógyulási arányokat eredményez méhnyakrák műtéti kezelésében.
- (7) A méhtestrák műtéti kezelésében alkalmazott őrszem-nyirokcsomó vizsgálatok és az endoszkópos technika alkalmazása csökkenti a morbiditást, de nem rontja a túlélési eredményeket.

A benyújtott munka jól tervezett és kivitelezett klinikai és kísérletes vizsgálatok eredményeit tartalmazza. Számos új adattal gazdagította a szülészet-nőgyógyászat területét, melyek közvetlenül vagy közvetve több kórkép gyógyulási eredményeinek javításához vezetnek.